

tué-rugueux ; tantôt il présente un espace presque lisse au milieu. Les interstries des élytres sont moins larges que le diamètre des points des stries. Le sommet de la tête est teinté de rouge chez le spécimen de l'Air. Les individus algériens diffèrent en outre de celui de l'Air en ce que leurs élytres sont sensiblement dilatés en arrière, tandis que, chez le dernier, ils sont très légèrement atténués.

L'*Opilo desertorum* se rapproche surtout de l'*O. dorsalis* Lucas, d'Algérie ; mais il est plus petit, son corps est plus allongé et différemment coloré, et il est hérissé de soies proportionnellement plus longues, notamment chez le ♂, sur le dernier segment apparent de l'abdomen. Il en diffère encore par l'absence de fossettes élytrales chez le ♂. Le ♂ de l'*O. dorsalis* possède en effet, sur chaque élytre, immédiatement en arrière de la fascie blanche, une fossette allongée, ovulaire, densément pubescente<sup>(1)</sup>, qui fait défaut chez la ♀.

---

ÉNUMÉRATION DES LONGICORNES RECUEILLIS EN ASIE

PAR M. DE MORGAN,

PAR M. M. PIC.

Les Insectes faisant l'objet de cet article ont été recueillis en 1904 par M. de Morgan ; ils proviennent, pour la plupart, de Perse, et appartiennent au Muséum de Paris<sup>(2)</sup>. Pour mieux distinguer les provenances, je séparerai les espèces provenant de la région caucasique de celles recueillies en Perse et régions voisines et, de plus, j'indiquerai pour chacune l'habitat précis relevé sur les étiquettes mises aux insectes.

En complément de cet article, consulter le précédent (Bull. n° 5, p. 300 et 301) où sont décrites plusieurs espèces et variétés recueillies pendant ce fructueux voyage.

**Insectes de la région caucasique.**

PARANDRA CASPICA Mén. — Elbourz : Talyche. Ghilan.

PRIONUS CORIARIUS L. — Elbourz : Talyche.

LEPTURA SCUTELLATA et var. OCHRACEIPENNIS Pic. — Elbourz : Talyche.

**Strangalia elboursensis** nov. sp. — Elbourz : Talyche.

Étroit et allongé, peu brillant, en majeure partie noir à macules fauves, orné d'une pubescence fauve courte et peu serrée, un peu soulevée ; an-

(1) La présence d'une semblable fossette est indiquée par Gestro chez l'*O. minus* (Ann. Mus. civ. di Genova, 1891, p. 761). Vraisemblablement, il s'agit également ici d'un caractère sexuel.

(2) Quelques espèces ou variétés font aussi partie de ma collection : *Polyarthron minutum* Pic, *Leptura Morgani* Pic, *Dorcadion* var. *Morgani* et *arabiense*.

tennes grêles, rousses avec le sommet des articles plus ou moins obscurci, 1<sup>er</sup> article très long, 3<sup>e</sup> aussi, 4<sup>e</sup> plus court; tête large, portée sur un cou long, rousse avec le vertex et le front noirs; prothorax noir, taché de roux sur les côtés en dessous, densément ponctué, très long, sinué sur les côtés, subgibbeux latéralement, diminué en avant, angles postérieurs saillants et presque droits; élytres bien plus larges à la base que le prothorax, atténués en arrière, obliquement échancrés au sommet avec les angles externes saillants, finement et éparsement ponctués, épaules arrondies et marquées en dedans d'une impression allongée; ces organes sont noirs et ornés chacun d'une tache infra-humérale et, sur le disque, de quatre taches ou courtes fascies disposées longitudinalement, isolées entre elles et des bords des élytres, celles-ci fauves; dessous du corps noir avec l'extrémité de l'abdomen un peu roussâtre; pattes grêles, rousses, avec les cuisses plus ou moins foncées ainsi que l'extrémité des tibias et une partie des tarsi. Longueur, 12 millimètres. Une ♀ des monts Talyche.

Sans doute voisin de *St. inermis* Dan. que je ne connais pas en nature, en différant par le système de coloration et la disposition des macules élytrales; je ne pense pas que ce soit une simple variété de l'espèce de Daniel.

*Alosterna scapularis* Heyd. — Elbourz : Talyche.

*Cerambyx multiplicatus* Mots. — Elbourz : Talyche.

*Aromia moschata* var. *thoracica* Fisch. — Elbourz : Talyche.

*Purpurigenus wachanrui* Lev. var. — Elbourz : Haute vallée de Chahrour.

*Clytus arietis* var. *lederi* Gglb. — Elbourz : Talyche.

*Caloclytus bartholomei* Mots. — Elbourz : Talyche.

— *comptus* Man. — Elbourz : forêt de Tunekaboun.

*Morimus verecundus* Fald. — Elbourz : Talyche, Ghilan, forêt de Tunekaboun.

#### Insectes de Perse, Louristan, etc.

*Prionus* sp. (peut-être *Balassogloi* var. *brevis* Sem.). — Poucht-é-Kouh : Sar-Bézin : Perse : chaîne Bordière de Suse à Ispahan.

*Prionus besicanus* Fairm. — Perse : chaîne Bordière de Suse à Ispahan.

*Polyarthron minutum* Pic. — Perse : de Suse à Ispahan.

*Macrotoma scutellaris* Germ. — Perse : chaîne Bordière de Suse à Ispahan.

*Aegosoma scabricorne* Scop. — Perse et Poucht-é-Kouh : Sar Bézin.

*Leptura rufa* Brull et var. — Chaldée Persane : Aiemabad, et Poucht-é-Kouh : Tagy-Mewla.

*Leptura morgani* Pic. — Perse : chaîne Bordière de Suse à Ispahan.

*Leptura scutellata* Ol. — Perse : chaîne Bordière de Suse à Ispahan.

*Cortodera umbripennis* var. *rostri* Pic. — Plateau persan occidental : de Zendjan à Ardébil.

*Cerambyx cerdo* L. var. — Perse : chaîne Bordière, de Suse à Ispahan.

AROMIA MOSCHATA VAR. THORACICA Fisch. — Perse : chaîne Bordière; Poucht-é-Kouh et Louristan.

AROMIA MOSCHATA VAR. AMBROSIACA Stev. — Plateau persan, de Hamadan à Casvin.

OSPHRANTERIA COERULESCENS Redt. — Perse : chaîne Bordière, de Suse à Ispahan.

OSPHRANTERIA SUAVEOLENS Redt. var. — Poucht-é-Kouh : Meillabandon.

STROMATIUM UNICOLOR Ol. — Plateau Persan : Hamadan.

CARTALLUM EBULINUM VAR. RUFICOLLE F. — Chaldée persane. Plateau persan occidental; Poucht-é-Kouh.

PLAGIONOTUS BOBELAYEI VAR. MOUZZAFERI Pic. — Perse : de Suse à Ispahan.

CLYTUS FLORALIS Pall. — Poucht-é-Kouh : Meillabandon.

CLYANTHUS VERBASCI VAR. FALDERMANNI Fald. — Plateau persan : Hamadan.

DORCADION BRUNNEICOLLE Kr. ♀ var. — Plateau persan, de Hamadan à Casvin.

La ♀, que je crois devoir rapporter à cette superbe espèce, est très robuste; elle a les élytres ornés d'une bande humérale blanche complète et, en plus, d'une bande dorsale assez régulière partant de la base, prolongée presque jusqu'à l'extrémité et rapprochée de la bande humérale.

Quelquefois, chez le ♂, le prothorax s'obscurcit et la bande dorsale blanche des élytres manque, tandis que la bande humérale largement effacée antérieurement est seulement marquée à l'extrémité (v. *casvinense* m.).

DORCADION TALYSCHENSE VAR. MORGANI Pic. — Plateau persan occidental, de Zendjan à Ardebil.

DORCADION TALYSCHENSE VAR. ARDEBIENSE Pic. — Plateau persan occidental, de Zendjan à Ardebil.

DORCADION PLASONI Kr. et var. — Plateau persan occidental, de Hamadan à Ardébil.

D. CINGULATUM Ggfb. et var. — Louristan et Poucht-é-Kouh.

D. HELMANNI Ggfb. var. — Plateau persan occidental, de Zendjan à Ardébil.

D. SCABRICOLLE Dalm. var. — Plateau persan occidental, de Hamadan à Ardébil; Louristan.

D. SEMIARGENTATUM Pic. — Perse : Azerbeïdjan, massif du Sahend.

D. sp. (peut-être FALDERMANNI var.). — Plateau persan occidental, de Khoïréabad à Hamadan.

AGAPANTHIA COERULEIPENNIS Friv. — Chaldée persane et Louristan.

AG. CARDUI L. — Chaldée persane : Suse et Dehleroun.

CALAMOBUS FILUM Rossi. — Chaldée persane et Louristan.

MALLOSIA MIRABILIS Fald. — Plateau persan occidental, de Hamadan à Zendjan et massif du Sahend.

CONIZONIA EUGENIAE Ggfb. ♂. — Lauristan : Tchahar-Dooul à Kirmanchah.

Je crois devoir rapporter à cette espèce une ♀ de la Chaldée persane à revêtement élytral uniforme et dont voici la description :

Assez allongé, subparallèle, noir revêtu d'une pubescence jaunâtre disposée en bandes sur le prothorax et continue sur les élytres; tête moyenne, sillonnée sur le front et le vertex, en partie pubescente, à ponctuation forte et écartée; antennes noires assez grêles, atteignant presque le sommet des élytres, troisième article très long, plus long que le quatrième; prothorax court, à peine plus large sur le milieu, sillonné transversalement près de la base qui est relevée, modérément ponctué, à large bande médiane pubescente et côtés latéraux également pubescents avec quelques grands poils dressés; élytres subdéprimés, un peu atténués à l'extrémité, obliquement tronqués en dedans au sommet, à ponctuation en partie mi-voilée par la pubescence et plus distincte en avant; pygidium saillant, peu long, élevé en carène sur son milieu et impressionné au sommet de chaque côté; pattes moyennes, foncées; dessous du corps pubescent de jaunâtre. Longueur, 18 millimètres.

PHYTOECIA (MUSARIA) PUNCTICOLLIS Fald. — Plateau persan occidental, de Zendjan à Ardébil, etc.

PHYTOECIA (HELLADIA) FERRUGATA Gglb. var. — Louristan.

PHYTOECIA (HELLADIA) HUMERALIS Walt. — Chaldée persane : Suse et Louristan.

PH. (HELLADIA) PRETIOSA Fald. — Chaldée persane : Suse.

PH. (HELLADIA) MILLEFOLI Adams. — Plateau persan occidental, de Hamadan à Zendjan.

PHYTOECIA PICI Reitt. — Plateau persan, de Hamadan à Casvin.

PH. VIRGULA Charp. — Chaldée persane : Tidar.

PH. BANGI Pic. — Chaldée persane : entre Tcham-i-Kaw et le Sein-Merreh.

OBBERA ERYTHROCEPHALA Sch. var. — Perse : chaîne Bordière, de Suse à Ispahan.

---

DIAGNOSES PRÉLIMINAIRES DE 34 ESPÈCES ET VARIÉTÉS NOUVELLES,  
ET DE 2 GENRES NOUVEAUX DE DÉCAPODES DE LA MER ROUGE,

PAR M. G. NOBILI.

(MUSÉE DE ZOOLOGIE ET D'ANATOMIE COMPARÉE, TURIN.)

Ces diagnoses sont extraites d'un travail sur la Faune carcinologique de la Mer Rouge qui paraîtra au cours de l'année 1906, dans les *Annales des Sciences naturelles*. Dans ce travail seront données les descriptions étendues et les figures.